



OSTEPARON

Granulato per cavalli
Mangime complementare

Quantitativo netto:

1 kg (40 buste da 25 g) - secchiello da **5 - 10 kg**

Assicura la corretta integrazione delle diete necessarie per soddisfare i fabbisogni nutritivi dei puledri e delle fattrici in gravidanza e in lattazione. Grazie all'equilibrato apporto di aminoacidi, vitamine, micro e macro elementi, elimina le principali carenze responsabili dei difetti di sviluppo e contribuisce alla maturazione del tessuto osteo-cartilagineo dei puledri.

COMPOSIZIONE

Destrosio, farina di riso, siero di latte in polvere, sale di sodio di acido stearico, fosfato bicalcico, cloruro di sodio.

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza	10 %
Fibra grezza	0,7 %
Oli e grassi grezzi	0,8 %
Ceneri grezze	18,00 %
Sodio	0,28 %

ADDITIVI PER KG

Vitamine

(3a672a) Vitamina A	10.000.000 UI
(3a671) Vitamina D3	200.000 UI
(3a821) Vitamina B1	7.000 mg
(3a825i) Vitamina B2	3.300 mg
(3a831) Vitamina B6 (piridossina cloridrato)	5.000 mg
Vitamina B12 (cianocobalamina)	20 mg
(3a300) Vitamina C	34.000 mg
(3a700) Vitamina E	20.000 mg
(3a316) Acido folico	1.400 mg
(3a880) Biotina	40 mg
(3a841) Calcio-D-pantotenato	2.700 mg
(3a711) Vitamina K3	12.000 mg
(3a315) Niacinamide	8.600 mg

Oligoelementi

Ferro (3b101) Carbonato di ferro (II) (siderite)	7.200 mg
Ferro (3b106) Chelato di ferro (II) di aminoacidi idrato	1.200 mg
Cobalto (3b304) Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti	67 mg
Rame (3b405) Solfato di rame (II) pentaidrato	2.050 mg
Rame (3b406) Chelato di rame (II) di aminoacidi, idrato	276 mg
Selenio (3b810) Lievito al selenio da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inattivato	10 mg
Manganese (3b503) Solfato manganoso monoidrato	13.500 mg
Manganese (3b505) Chelato di manganese di idrolizzati proteici	1.500 mg
Zinco (3b605) Solfato di zinco monoidrato	10.800 mg
Zinco (3b612) Chelato di zinco di proteine idrolizzate	1.200 mg

Aminoacidi

(3c301) DL-metionina	35.000 mg
(3c322) L-lisina monocloridrato	70.000 mg

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO

Fattrici: negli ultimi 3 mesi di gestazione 1 siringa al giorno, in lattazione 2 siringhe al giorno.

Puledri: 1 siringa al giorno entro il primo anno di età.

In seguito 2 siringhe al giorno.

Miscelare accuratamente alla razione.

La somministrazione simultanea di vitamina D2 è vietata.

Mangimi complementari per il benessere del cavallo / **OSTEPARON**