



Reidrata



## REIDRATA

Pasta orale e polvere per cavalli  
Mangime complementare minerale con particolare fine nutrizionale

Quantitativo netto:  
5 siringhe da **100 g** - **1 kg** (25 buste da 40 g) - secchiello da **5 kg**

## Compensazione delle perdite elettrolitiche in caso di sudorazione elevata

### COMPOSIZIONE

#### PASTA

Olio di vaselina, cloruro di sodio, bicarbonato di sodio, gluconato di calcio, solfato di magnesio anidro.

#### POLVERE

**Box 1:** Cloruro di sodio, cloruro di potassio, bicarbonato di sodio, gluconato di calcio, solfato di magnesio anidro.

**Box 2:** Destrosio, sale di magnesio di acido stearico.

#### ADDITIVI PER KG (dopo miscelazione)

#### PASTA

**Conservanti:** (E332) Potassio citrato 79.500 mg

**Aromatizzanti:** (2b17034) Glicina 149.000 mg

#### POLVERE

**Vitamine:** (3a300) Vitamina C 40.000 mg

**Aromi:** (2b17034) Glicina 55.000 mg

#### COMPONENTI ANALITICI

#### PASTA

Proteina grezza 18,0 %

Fibra grezza 0,11 %

Oli e grassi grezzi 0,83 %

Ceneri grezze 27,0 %

Sodio 8,15 %

#### POLVERE

Proteina grezza 6,83 %

Fibra grezza 0,04 %

Grassi grezzi 0,48 %

Ceneri grezze 65,48 %

Calcio	0,17 %
Sodio	12,47 %
Fosforo	000 %
Magnesio	0,15 %
Potassio	9,82 %
Cloruri	10,49 %

### ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO

#### PASTA

**Cavalli adulti:** 50-100 g al di

**Puledri:** 25-50 g al di

Prestabilire la quantità avvitando la ghiera sullo stantuffo della siringa.

#### POLVERE

La busta bicamerata da 40 g assicura la massima stabilità del prodotto separando gli elementi che potrebbero reagire chimicamente tra loro durante il periodo di conservazione. È costituita da due scomparti stagni il cui contenuto deve essere miscelato e completamente sciolto nell'acqua al momento della somministrazione affinché sia assicurato un apporto elettrolitico e vitaminico bilanciato. Negli stati di disidratazione del cavallo conseguente a sudorazione fornire da 1 a 4 buste al giorno a seconda dell'intensità e della durata del lavoro, l'entità della sudorazione o il grado di disidratazione. Periodo d'impiego consigliato dopo la sudorazione elevata: da 1 - 3 giorni. Per prevenire gli stati di disidratazione in previsione dei trasporti e del lavoro durante le stagioni calde o ventilate anche a basse temperature ambientali, somministrare 1-2 buste al giorno. Sciogliere accuratamente il contenuto di una busta bicamerata da 40 g ogni 8 litri di acqua di bevanda e somministrare indipendentemente dal peso corporeo, oppure miscelarlo omogeneamente nella razione. Nei puledri dimezzare le dosi.

Mangimi complementari per il benessere del cavallo / REIDRATA