



REPLAY

La riattivazione della flora intestinale

Replay favorisce il ripristino della flora intestinale fisiologica. È consigliato nel dismicrobismo intestinale conseguente a malattie infettive, enteriti, coliche, stipsi, trattamenti antibiotici, eventi stressanti, debilitanti, immunodepressivi, allenamento gravoso, competizioni, trasporti.

COMPOSIZIONE

ANALISI CHIMICA

Proteina grezza	7,1 %
Cellulosa grezza	2 %
Oli e grassi grezzi	0,2 %
Ceneri grezze	6,6 %
Sodio	1,7 %

ADDITIVI PER KG

Additivi zootecnici

(4a1704) Saccharomyces cerevisiae
CBS 493.94 5 x 10¹⁰ UFC

Aminoacidi

(3.2.3.) L-lisina monocloridrato 50.000 mg

Composti di oligoelementi

(E2) Ioduro di potassio 167 mg

PROPRIETÀ

Replay contribuisce al ripristino delle condizioni fisiologiche dell'intestino. Grazie alla presenza di Saccharomyces cerevisiae è in grado di migliorare la digestione dell'amido e della fibra, mentre l'inulina stimola la replicazione dei microrganismi necessari per un'ottimale funzionalità intestinale.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO

Cavalli: mezza siringa al giorno per almeno 4 giorni consecutivi.

Puledri: un quarto di 1 siringa al giorno per almeno 4 giorni consecutivi.

La dose raccomandata di Saccharomices cerevisiae per Kg di mangime completo è pari a 4,7 x 10⁹ UFC. Conservare in un luogo fresco ed asciutto al riparo dall'umidità, ad una temperatura non superiore a 25 °C.

SIRINGA DA 100 G

Nei puledri neonati: un quarto di siringa al dì per 4 giorni consecutivi a partire dal primo giorno di vita.

Nei puledri svezzati: mezza siringa al dì per due giorni consecutivi.

Nei casi di dismicrobismo e di enteriti conclamate:

Puledri: 0,5-1 siringa al dì fino alla completa remissione dei sintomi;

Cavalli: 1-2 siringhe al dì fino alla completa remissione dei sintomi.

TUBO DA 300 G

Inserire il tubo nell'apposita pistola, introdurre il tubo profondamente nella cavità orale. Erogare il prodotto premendo a fondo la leva di dosaggio.

Una dosata eroga 10 g di pasta orale.

Puledri: 3 dosate al dì per 4 giorni consecutivi.

Cavalli: 8 dosate al dì per 4 giorni consecutivi.

POLVERE

In caso di dismicrobismo ed enterite conclamata:

1 misurino al dì fino alla remissione della sintomatologia

CONFEZIONI

Siringa multidose da 100 g di pasta orale

Tubo siringa da 300 g di pasta orale da somministrare mediante apposita pistola erogatrice non compresa nella confezione

Barattolo da 800 g di polvere

Secchiello da 5 Kg di polvere