



ASTRIX

Nelle patologie enteriche, la via alimentare assume un ruolo rilevante nella trasmissione di batteri patogeni. Tali patologie colpiscono animali di 3 - 6 giorni di vita e possono avere andamento acuto. Le endotossine batteriche ricoprono un ruolo determinante nelle manifestazioni generalizzate della malattia. La particolare formulazione di Astrix consente di contrastare gli effetti dannosi dovuti all'assorbimento delle tossine con conseguente riduzione delle manifestazioni cliniche di diarrea.

COMPOSIZIONE

ANALISI CHIMICA

Proteina Grezza	6.50 %
Cellulosa Grezza	4.50 %
Oli e Grassi Grezzi	0.50 %
Ceneri Grezze	16.50 %
Sodio	1.70 %
Glicina	2.50 %

ADDITIVI PER KG

Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo

E (300)

Vitamina C (acido-L-ascorbico) 4900 mg/kg

Stabilizzatori della flora intestinale

(4a1704) Saccaromyces Cerevisiae

CBS 493.94 1,25 x 10⁹ C.F.U.

Additivi tecnologici

(1m558i) Bentonite 100000 mg

(E415) Gomma di Xantano 10000 mg

PROPRIETÀ

Astrix, grazie alla sua formulazione, aiuta i vitelli nei primi giorni di vita a contrastare la diarrea e l'assorbimento di tossine batteriche da parte della mucosa.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO

Miscelare 50 g di ASTRIX ogni litro di acqua somministrando la soluzione così ottenuta entro 15-20 minuti:

Vitelli ai primi sintomi di diarrea:

2 litri 2 volte al giorno

Vitelli estremamente deboli con diarrea:

0.7 litri 3 volte al giorno

CONFEZIONE

Secchiello da 10 Kg