

Getway migliora la reattività del puledro all'ambiente, favorendo la buona efficienza delle sue difese immunitarie. Getway rappresenta l'alternativa naturale al colostro di cavalla. È stato specificatamente formulato per conferire l'immunità passiva al puledro in tutte le circostanze nelle quali l'assunzione del colostro materno risulti inadeguata o impraticabile. Raccomandato nel caso in cui la fattrice sia defedata, anche in conseguenza di un parto difficile, nel caso abbia problemi di mastite o sia una primipara povera di colostro. Consigliato nei puledri in acidosi respiratoria postnatale (dismetabolismo che riduce l'assorbimento di immunoglobuline) o costituzionalmente deboli.

COMPOSIZIONE

Proteine di siero di latte in polvere, colostro in polvere.

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza	76 %
Fibra grezza	3 %
Oli e grassi grezzi	8 %
Ceneri grezze	0 %
Sodio	0,17 %

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO

Puledri orfani di taglia media:

1 busta da 450 g di Getway in 1 litro d'acqua pari a 1,45 litri di prodotto ricostituito.

Puledri nati da primipare o nei quali l'assunzione di colostro materno sia stata incompleta:

Mezza busta di Getway in 0,5 litri d'acqua pari a 725 ml di prodotto ricostituito.

Ricostituire il prodotto versando in un contenitore pulito 500 ml di acqua alla temperatura di 40° C. Aggiungere gradualmente la polvere contenuta nella busta all'acqua, miscelando accuratamente.

Ottenuta una sospensione omogenea, aggiungere altri 500 ml di acqua calda e mantenere in agitazione fino a riottenere una sospensione omogenea di 1,45 litri di prodotto pronto per la somministrazione. Somministrare subito dopo la ricostituzione alla temperatura di 38/40 °C preferibilmente nei primissimi istanti di vita del puledro in quanto l'assorbimento degli anticorpi è massimo entro le prime 2 ore e si riduce gradualmente sino ad esaurirsi dopo 24/36 ore. Ai neonati dotati di buona vitalità somministrare per mezzo di un biberon; ai puledri poco vitali che potrebbero essere privi del riflesso della deglutizione, somministrare mediante un sondino rinoesofageo.

Non somministrare latte ricostituito prima che il puledro abbia assunto la dose corretta di Getway.