



REIDRATA LED

Mangime complementare per cavalli
in polvere idrodispersibile

Quantitativo netto: barattolo da **800 g** - secchiello da **10 kg**

Per la preparazione istantanea di bevande energetico-saline ipotoniche da somministrare prima, durante e dopo l'attività fisica del cavallo.

COMPOSIZIONE

Maltodestrina, farina di riso, fruttosio, farina di carrube, saccarosio, cloruro di sodio, cloruro di potassio, bicarbonato di sodio, gluconato di calcio, solfato di magnesio anidro.

ADDITIVI PER KG

Aminoacidi

(3c370) Valina	10.000 mg
(3c3.8.1) Isoleucina	10.000 mg
(3c382) l-leucina	20.000 mg

Vitamine

(3a300) Vitamina C	1.500 mg
(3a700) Vitamina E	2.500 mg

Oligoelementi

Selenio (3b810) Lievito al selenio da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060, inattivato	0,2 mg
---	--------

Aromi

(2b17033) L-Cisteina HCL	5.000 mg
(2b17034) Glicina	3.500 g

Conservanti

(E327) Calcio lattato	22.500 mg
(E281) Sodio propionato	5.000 mg

Coloranti

(E141) Clorofilla ramata	500 mg
--------------------------	--------

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza	8,5 %
Cellulosa grezza	2,5 %
Oli e grassi grezzi	1,5 %
Ceneri grezze	3,5 %
Sodio	1,1 %

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO

A seconda del grado di disidratazione, intensità e durata del lavoro, condizioni climatiche e durata del trasporto, utilizzare secondo le seguenti modalità:

- Disciogliere il contenuto del barattolo dosatore (800 g) in almeno 10 litri di acqua tiepida e fornire da 1 a 4 volte al dì.
- Disciogliere il contenuto di mezzo barattolo dosatore (400 g) in almeno 5 litri di acqua tiepida e fornire da 1 a 4 volte al dì.

Quando: Prima, durante e dopo l'attività fisica; prima, durante e al termine dei trasporti.

Nelle competizioni di endurance somministrare REIDRATA LED ai cancelli veterinari, al termine dalle gare e al rientro in scuderia.

Mangimi complementari per il benessere del cavallo / REIDRATA LED