



TONALYTE

Il benessere

Ideale per integrare razioni alimentari a base di cereali e foraggi.

Apporta in elevata concentrazione vitamine, minerali e amminoacidi per soddisfare gli elevati fabbisogni dei cavalli sportivi, degli stalloni, delle fattrici e dei puledri.

COMPOSIZIONE

ANALISI CHIMICA

Proteina grezza	12 %
Fibra grezza	0,7 %
Oli e grassi grezzi	0,8 %
Ceneri grezze	12,6 %
Sodio	0,28 %

ADDITIVI PER KG

Vitamine

(E672) Vitamina A	10.000.000 UI
(E671) Vitamina D3	200.000 UI
(3a316) Acido folico	1.400 mg
Acido pantotenico (calcio-D-pantotenato)	2.700 mg
Biotina	40 mg
Vitamina B1 (tiamina mononitrato)	6.700 mg
Vitamina B2 (riboflavina)	3.300 mg
(3a831) Vitamina B6 (piridossina cloridrato)	5.000 mg
Vitamina B12 (cianocobalamina)	20 mg
(E300) Vitamina C (Acido L-Ascorbico)	34.000 mg
Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferil acetato)	20.000 mg
Vitamina K	12.000 mg
(3a315) Niacinamide	8.600 mg

Composti di oligoelementi

(E1) Carbonato ferroso	18.000 mg
(E1) Chelato di ferro di aminoacidi idrato	8.000 mg
Carbonato di cobalto in granuli rivestiti	1.340 mg
(E4) Solfato rameico pentaidrato	9.000 mg
(E4) Chelato rameico di aminoacidi	2.500 mg
(3b8.10) Forma organica del selenio da <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	500 mg
(E5) Solfato manganoso monoidrato	17.500 mg
(E5) Chelato di manganese di aminoacidi idrato	4.200 mg
(E6) Solfato di zinco monoidrato	30.000 mg
(E6) Chelato di zinco di aminoacidi idrato	12.000 mg

Aminoacidi

(3c301) DL-metionina	35.000 mg
(3.2.3.) L-lisina monocloridrato	70.000 mg

PROPRIETÀ

Cavalli: per sostenere l'attività sportiva

Stalloni: per sostenere l'attività riproduttiva durante la stagione di monta.

Fattrici: per sostenere la gravidanza e la lattazione.

Puledri: per stimolare l'accrescimento durante ed in seguito allo svezzamento, utile nei casi di ritardato sviluppo. Favorisce il recupero durante l'attività agonistica, gli stati di debilitazione organica e le convalescenze

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO

Puledri: 1 busta o 1 misurino al dì.

Cavalli: 1-2 buste o 1-2 misurini al dì.

Miscelare accuratamente alla razione. Si consiglia di protrarre la somministrazione per almeno 60 giorni consecutivi. La somministrazione simultanea di vitamina D2 è vietata.

CONFEZIONI

Scatola contenente 40 buste da 25 g

Secchiello da 5 Kg con misurino

Secchiello da 10 Kg con misurino